



Quand doit-on utiliser un auto-injecteur d'adrénaline?



Suite à l'exposition à un **allergène connu** ou **suspecté**

QUAND UTILISER MON AUTO-INJECTEUR D'ÉPINÉPHRINE

- Si j'ai une apparition soudaine et rapide d'au moins 1 symptôme dans 2 de ces catégories

OU

- Si la réaction est sévère dans une seule catégorie

- Digestif** : vomissements, diarrhée, crampes au ventre
- Respiratoire** : essoufflement, toux, respiration sifflante, enflure des voies respiratoires, écoulement ou congestion nasale, voix rauque
- Bouche/Peau** : démangeaison, plaques rouges, enflure
- Symptômes reliés à la baisse de tension artérielle** : étourdissement, évanouissement, somnolence, grande faiblesse

© 2016

Cette initiative a été rendue possible grâce à une collaboration en matière de santé entre le service d'allergie-immunologie du CHU et de Pfizer Canada inc.

Service d'allergie CHU et immunologie Québec

Cette affiche a été réalisée par le service d'allergie et immunologie du CHU de Québec et l'entreprise Pfizer Canada Inc.



Consulter le site : www.epipen.ca/fr pour des vidéos et de nombreuses informations sur l'auto-injecteur EpiPen^{MD}

Christine Gadonneix, Dt.P., nutritionniste